

100k
lives

100,000 Lives Campaign

Some is not a number

Soon is not a time

Mål

- Red 100.000 liv på 18 måneder (slutdato: 14/6-2006)
- Mindst 2000 hospitaler tilmeldt kampagnen
- Opbygning af national "infrastruktur for forandring" i sundhedsvæsenet

www.ihl.org/ihl/programs/campaign/

Kampagnestatus april 2006

- Flere end 3000 hospitaler tilmeldt
- Alle amerikanske stater repræsenterede
- Estimeret 61.000 liv reddet

Kampagnens elementer

- **Platform:** 6 evidensbaserede tiltag
- **Målinger:** Hvordan resultaterne måles
- **Implementering:** Hvordan kampagnen udbredes
- **Kommunikation:** Hvordan kampagnens delmål og resultater formidles

Platform – seks tiltag der redder liv

- Tilkald **mobilt akut-team** ved mindste tegn på forværring hos patient
- Korrekt **behandling af hjerte-blodpropper**
- Forebyggelse af **medicineringsfejl** ved brug af medicinafstemning i overgangsfaser
- Forebyggelse af **venekateter-infektioner** ved indførsel af *kateter-pakken*
- Forebyggelse af **kirurgiske sårinfektioner** ved perioperativ administration af antibiotika
- Forebyggelse af **respirator-relaterede lungeinfektioner** ved indførsel af *respirator-pakken*

Korrekt behandling af AMI

- Acetylsalicylsyre og beta-blokker tidligt i forløbet og ved udskrivelse
- ACE-hæmmer eller angiotensin-receptorblokker ved udskrivelse hos patienter med systolisk dysfunktion
- Akut reperfusion (trombolyse eller perkutan intervention)
- Hjælp til rygeophør

Forebyggelse af kirurgiske sårinfectioner

- Profylaktisk brug af antibiotika
- Korrekt hårfjernelse (undgå barberskrabere)
- Perioperativ kontrol af blodsukker
- Perioperativ kontrol af legemstemperatur

Forebyggelse af CVK-relaterede blodinfektioner

- Håndhygiejne
- Maksimal barriere ved kateteranlæggelse (steril påklædning af personale og steril afdækning af patient)
- Optimal katetersted (vena subclavia)
- Daglig revurdering af kateterets nødvendighed (inkl. fjernelse så snart, kateteret ikke længere er nødvendigt).

Forebyggelse af respiratorrelaterede lungeinfektioner (mv.)

- Korrekt lejring af patient (elevation af hovedgærde 30-45 grader)
- Sedationspauser og daglig vurdering af mulighed for ekstubation
- Medicinsk forebyggelse af mavesår
- Medicinsk forebyggelse af venøse blodpropper

Medicinafstemning i overgangs- situationer

- En procedure hvor patientens aktuelle medicinliste sammenlignes med lægens ordinationer i forbindelse med indlæggelser, udskrivelser og overflytninger
- Uoverensstemmelser opklares ved kontakt til ordinerende læge

Mobilt akut-team

- Et hold fx bestående af en erfaren intensivlæge og -sygeplejerske, der kan tilkaldes når som helst af hvem som helst til at bistå i vurdering af kritisk syge patienter

Målinger

- Antal tilmeldte hospitaler
- Tiltag der implementeres (indikatorer)
- Ændringer i hospitalernes dødsrater

Implementering

- Opnå opmærksomhed og forandringsvilje lokalt i organisationerne
- Udvælge tiltag til implementering lokalt
- Tilmelding
- Implementere udvalgte tiltag på hospitalerne

Kommunikation

- Kampagnens fremgang, resultater og lokale/regionale succeshistorier publiceres løbende på hjemmesiden
- Debatfora og web-log for deltagere på hjemmesiden (åben for andre interesserede)
- Skabelon til lokale pressemeddelelser tilgængelig på hjemmesiden

100k Lives Campaign på dansk

- Vurdere relevans af de 6 tiltag i en dansk sammenhæng (DSFP)
- Audit af 50 dødsfald (H:S, Vejle Amt)
- Undersøge implementeringsgrad af tiltag fra respirator-pakken (H:S)
- Undersøge potentielle effekt af medicinafstemning (H:S, Københavns Amt)
- Model til beregning af hospitals-standardiseret dødelighed (Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus; Paul Bartels)
- Evaluere 18-måneders resultaterne fra 100,000 lives Campaign (14. juni 2006)
- Skitsering af en dansk kampagne (DSFP)

Diskussion

- Er de 6 tiltag relevante i Danmark?
- Hvor mange liv kunne reddes i Danmark?
- Hvordan skal en dansk kampagne skrues sammen?
- Hvem skal deltage?
 - obligatorisk?
 - tilmelding?
 - udvælgelse?
- Barrierer